

metoject[®]

Metotrexato


INYECCIÓN SUBCUTÁNEA DE METOJECT[®]

METOJECT[®] se presenta en jeringas precargadas con aguja para inyección subcutánea de 1 ml = 10 mg, 1,5 ml = 15 mg, 2 ml = 20 mg y 2,5 ml = 25 mg de Metotrexato

ASEGÚRESE que la jeringa contiene la dosis exacta prescrita por el medico

1

Quite la protección de la jeringa y ponga la aguja. Una vez ajustada, quite la protección de la aguja (con cuidado de no tocarla).




2

Desinfecte la piel usando un algodón con alcohol y pellizque la piel entre el pulgar y el índice, sin apretar.




3

Inserte completamente la aguja en la piel con un ángulo menor de 45 grados (levemente transversal).



4


Inyecte el líquido lentamente, manteniendo siempre la piel pellizcada. Empuje a través del émbolo hasta que se vacíe la jeringa.



5

Tras inyectar la solución, retire la aguja y suelte la piel.

Los lugares más adecuados para poner la inyección:



- Abdomen (fuera del área alrededor del ombligo y de la cintura).
- Nalgas.
- Muslos (frente y lado pero no dentro del área inguinal o en la rodilla)

Debe elegir un sitio distinto para cada inyección semanal.

¿Cómo deshacerse de las jeringas usadas?

- No vuelva a poner la cubierta protectora en las agujas ya usadas.
- Ponga las jeringas usadas en un recipiente adecuado y reservado a tal efecto y manténgalo fuera del alcance y de la vista de los niños hasta la entrega en su farmacia para su destrucción controlada.

No olvide que ...

**meto
ject**®
Metotrexato



Solución Inyectable



METOJECT® se aplica únicamente cada siete días (una vez a la semana).



Si olvidó utilizar METOJECT®, no utilice una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Utilice una sola dosis y continúe la administración a los siete días.



Si el metotrexato entra en contacto con su piel, se debe aclarar inmediatamente el área afectada con abundante agua.



Mantenga METOJECT® fuera del alcance y de la vista de los niños.




Conservar en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. No utilizar METOJECT® después de la fecha de caducidad.



Recuerde llevar las jeringas usadas a su farmacia, para su destrucción.



 Gebro Pharma

Laboratorios Gebro Pharma, S.A.
C/ Monestir, 23 · 08034 Barcelona · España
laboratorios@gebro.es
Teléfono de contacto 93 205 86 86