

## **PROCOLO ADMINISTRACIÓN DE RITUXIMAB** **(Reumatología/Artritis Reumatoide)**



**\*Dosis de Rituximab 1000mg**

**\*Volumen de Rituximab 100ml**

**\*Volumen total 350ml (100ml de Rituximab en 250ml de suero fisiológico)**

**\*Premedicación (30 minutos antes de iniciar perfusión Rituximab)**

- Metilprednisolona 100 mg iv.
- Paracetamol 1gr iv.
- Dexclorfenilamina (Polaramine) 5mg iv.

### o **Día 1: primera infusión.**

- Monitorización de signos vitales (TA, FC, T<sup>a</sup>) durante la primera hora cada 15 minutos y posteriormente cada hora
- Comience la infusión a una velocidad de 12 ml/hora.
- Si pasados 30 minutos no se produce ninguna reacción, incremente la velocidad a 24 ml/hora.
- Si no tiene lugar ninguna reacción a la infusión, continúe aumentando la velocidad 12 ml/hora, cada 30 minutos, hasta un máximo de 100 ml/hora.

Con este procedimiento, el tiempo de infusión mínimo será de 4:15 horas (255

<b>Tiempo (minutos)</b>	<b>Velocidad de infusión (mL/hora)</b>
0-30	12
31-60	24
61-90	38
91-120	50
121-150	62
151-180	75
181-210	88
212-240	100
241-255	100

minutos).

### o **Día 15: segunda infusión.**

- Monitorización de signos vitales (TA, FC, T<sup>a</sup>) durante la primera hora cada 15 minutos y posteriormente cada hora.
- Si el paciente no toleró bien la primera infusión, empiece con 12 ml/hora y siga las instrucciones descritas para la primera infusión.
- Si toleró bien la primera infusión, comience a una velocidad de 24 ml/hora.
- Si pasados 30 minutos no se produce ninguna reacción, incremente la velocidad a 50 ml/hora.
- Si la infusión transcurre con normalidad, aumente la velocidad 24 ml/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 100 ml/hora.
- Con este procedimiento, el tiempo de infusión mínimo será de 3:15 horas (195 minutos).

<b>Tiempo (minutos)</b>	<b>Velocidad de infusión (mL/hora)</b>
0-30	24
31-60	50
61-90	75
91-120	88
121-150	100
151-180	100
181-195	100